

# MEGAFOL

10L (20°C) - 12 kg NET WEIGHT / 실 중량



ENGLISH ORGANO-MINERAL LIQUID FERTILISER NK 3-0-8

**COMPOSITION w/w (w/v):** total Nitrogen (N) 3.0% (36.6 g/L); organic Nitrogen (N) 1.0% (12.2 g/L); ureic Nitrogen (N) 2.0% (24.4 g/L); Potassium Oxide (K<sub>2</sub>O) soluble in water 8.0% (97.6 g/L); organic Carbon (C) of biological origin 9.0% (109.8 g/L). **FORMULATION:** liquid.

## CHARACTERISTICS

MEGAFOL allows crops to compensate plant growth stop.  
MEGAFOL is useful to improve foliar uptake of products used in mixture, applied to the leaves.

## TIMING AND RATE OF APPLICATION

(Foliar applications at 10-15 day intervals throughout the crop cycle).  
Fruit, vegetables, processing crops and ornamentals in open field: 2-3 L/ha; fruit, vegetables and ornamentals under protection: 150-250 ml/100 L. Mixed with herbicides: 1 L/ha.

**CAUTION:** do not mix with copper on crops sensitive to this element.  
Do not mix with white oils.

## 한국어 유기미네랄 액체비료 NK 3-0-8

**제품 성분 w/w (w/v):** 총 질소 (N): 3.0% (3.6%);  
유기질소 (N): 1.0% (1.2%); 요소질소 (N): 2.0% (2.4%);  
산화칼륨 (K<sub>2</sub>O) 수용성 물질: 8.0% (9.6%);  
생물기반 유기탄소(C): 9.0% (10.8%).

MEGAFOL 식물 성장 촉진제 겸 스트레스 내성 증강제.

**시비 시기 및 시비량:** 엽면 시비, 과실 작물: 2-3 L/ha; 노지 채소: 2-3 L/ha; 하우스: 100-200 ml/100 L. 산업작물: 2.5-3 L/ha.

**주의:** 구리 제품과 혼합 시비시 식물 약해를 야기할 수 있습니다.  
포도, 토마토, 올리브에는 구리 제품과 혼합 사용이 가능합니다.  
광물유와 같이 사용하지 마십시오.

추천 시비량을 초과하지 마시고 적정량만 사용하십시오.  
적정 보관온도: 0.

별크 포장 판매는 하지 않음.

MIX THOROUGHLY BEFORE USE.

Product is stable, if stored between 0°C and 40°C. In case of fire, use plenty of water.

MADE IN ITALY



foliar application, 잎의 응용 프로그램,  
лиственный, 叶面喷施, уприсқан татбиқ,  
фолиарна апликација, Blattapplikation,  
toepassing voor blad

 **Valagro**<sup>®</sup>

Where science serves nature

4239112F85P1EF 01



**DEUTSCH | Organisch-mineralischer NK-Dünger 3-0-8 suspendiert**

**Zusammensetzung g/g (g/v):** gesamt Stickstoff (N): 3,0% (3,6%); gelöster organischer Stickstoff (N): 1,0% (1,2%); Carbadimidstickstoff (N): 2,0% (2,4%); wasserlösliches Kaliumoxid (K<sub>2</sub>O) mit niedrigem Chlorgehalt: 8,0% (9,7%); organischer Kohlenstoff (C) biologischer Abstammung: 9,0% (10,9%).  
**Formulierung:** flüssig.

**MEGAFOL | Antistress und Wachstumsaktivator für Blattapplikation.**

**Dosierung und anwendung:** BLATTAPPLIKATION nach jeweils 10 - 15 Tage während dem ganzen Anbauzyklus. Obst-, Gemüse-, Industrie- und Zierpflanzen im Freiland: 2 - 3 l / ha. Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen unter Gewächshäusern: 150 - 250 ml / 100 L. Bei Verwendung mit Herbiziden: 1 l / ha.

**Hinweise:** nicht mischen mit Kupferpräparaten bei Pflanzen, die auf dieses Element empfindlich reagieren; nicht mit Weißölen mischen.

Bei langer Lagerung, das Produkt vor der Entnahme und dem Gebrauch sorgfältig vermischen. Bei Lagerung des Produkts zwischen 0 und +40° C bestehen keine Konservierungsprobleme. Bei Umgebungsbrand mit reichlich Wasser löschen.

Gegenseitige Anerkennung Verordnung (EG)

Nr. 764/2008, Megafol ist in Italien D.Lgs. 75/2010 eingeschrieben

**МАКЕДОНСКИ | Органико минерален фертлизатор NK во раствор 3-0-8**

**Состав г/г (г/л):** целосен азот (N): 3,0% (3,6 г/л), органиски азот (N): 1,0% (1,2 г/л); урејски азот (N): 2,0% (2,4 г/л); оксид на калиум (K): со раствора во вода (K<sub>2</sub>O): 8,0% (9,7 г/л); органиски јаглен (C) од биолошко потекло: 9,0% (10,9 г/л). **Формула:** течна состојба.

**MEGAFOL | Активатор на растот и анти-стрес.**

**Начин на употреба и дозирање:** ТРЕТИРАЊЕ НА ЛИСТОВИТЕ на секои 10 до 15 дена за време на целиот циклус на одгледување. Овошни плодови, градинарски, индустриски, украсни на цело поле: 2 - 3 л / ha. Овошни, градинарски, украсни под стаклена градина: 150 - 250 ml / 100 L. Заедно со производ против троскот 1 l / ha.

**Предупредување:** да не се меша со бакар на култури кои се чувствителни на овој елемент, да не се меша со бели масла.

Да се хомогенизира внимателно производот пред да се преточува или користи. Доколку производот се чува во магацин на температура од 0 до 40° C не треба да постојат никакви проблеми за негова конзервација. Во случаи на пожар во кој би можел да биде вклучен производот користете обилни количества на вода.

**NEDERLANDS | Organisch-minerale mest NK 3-0-8 in suspensie.**

**Samenstelling w/w (w/v):** totaal Stikstof (N): 3,0% (3,6%); organische Stikstof (N): 1,0% (1,2%); ureische Stikstof (N): 2,0% (2,4%); in water oplosbaar Kaliumoxide (K<sub>2</sub>O): 8,0% (9,7%); organische Koolstof (C) van biologische oorsprong: 9,0% (10,9%). **Formule:** vloeibaar.

**MEGAFOL | Bladactivator voor groei en anti-stress.**

**Dossissen en gebruiksaanwijzing: AANBRENGING OP HET GEBLADERTE.**

Behandeling bladeren elke 10 - 15 dagen gedurende de hele groeicyclus. Fruitbomen, groenten, industriële (energie-) gewassen, sierplanten in het open veld: 2 - 3 l / ha. Fruitbomen, groenten, sierplanten in kassen: 150 - 250 ml / 100 L. In combinatie met onkruidverdelgers: 1 l / ha.

**Waarschuwing:** niet mengen met koper voor gewassen die gevoelig zijn voor dit element; niet mengen met witte oliën.

In het geval van langdurige opslag moet men het product zorgvuldig roeren vóórdat men het eruit haalt en vóór het gebruik. Als het product wordt bewaard bij een temperatuur tussen 0° C en +40° C dan zijn er geen problemen met de houdbaarheid. In geval van brand, waar het product bij betrokken is, moet men ruim water gebruiken.

Distributed in NZ by: AGRITRADE, 411 Blenheim Rd, Sockburn, Christchurch 8140, Ph 03 441 4587, Fax 03 341 4584, Free Phone 0800 333 855.  
Distributed in Australia by: Campbells Fertilisers Australasia Pty Ltd 18 Raymond Rd, Laverton North Victoria, Australia, 3026 Web: www.campbellsfert.com.au

**Net weight, шл. змрл, netto Inhalt, нето маса, ปริมาณสุทธิ, netto gewicht, 淨重 12 Kg (10 l - 20° C).**

**ภาษาไทย | ปุ๋ย NPK 3-0-8**

**ส่วนผสม w/w (w/v):** ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 3.0 (3.6%); ไนโตรเจน อินทรีย์ (N) 1.0% (1.2%); ยูเรีย (N) 2.0% (2.4%); โพแทสเซียมละลายน้ำ (K<sub>2</sub>O) 8.0% (9.6%); คาร์บอนอินทรีย์ (C) 9.0% (10.8%).

**สูตร: ของเหลว.**

**MEGAFOL | สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและส่งเสริมให้พืชต้านทาน อาหารซึ่งเกิดจากความเครียด**

**ปริมาณและวิธีใช้งาน:** การให้ปุ๋ยทางใบ.

ไม้ผล ใช้อัตรา 320 - 480 มล./ไร่; พืชผัก ปลูกในกระบะใช้ ใช้อัตรา 320 - 480 มล./ไร่ และปลูกในโรงเรือนใช้ อัตรา 100 - 200 มล.ผสมน้ำ 100 ลิตร; พืชอุตสาหกรรม ใช้อัตรา 400-480 มล./ไร่.

**คำเตือน:** ความเป็นพิษต่อพืช.

ผลิตภัณฑ์นี้ถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษกับพืชได้ ในการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ทองแดงเป็นส่วนประกอบจะใช้ได้กับพืชดังต่อไปนี้ คือ มะกอก องุ่น และมะเขือเทศ. ไม่ควรใช้ร่วมกับไมเออร์ออลอยด์.

Distributed in Thailand: ผู้จำหน่ายเข้ามาในราชอาณาจักร: บริษัท ดิวิจิลด์ แอสโซซิเอท จำกัด

37 ซ.รามอินทรา 56 ถ.รามอินทรา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10230 | โทร. 392/2548

**AZƏRİ | Organik mineral gübrə.**

**Organik mineral gübrə NK dayandırılması 3-0-8**

**Tarkibi w/w (w/v):**

Azot (N) cami: 3,0% (3,6%) -nə barabərdir; üzvi Azot (N): 1,0% (1,2%) -nə barabərdir; Azot (N) sidik cövhəri: 2,0% (2,4%) barabərdir; Kalium Oksid (K<sub>2</sub>O) 8,0% hall olan (9,7%) -nə barabərdir; bioloji mənşəli üzvi karbon (C): 9,0% (10,9%).

**Formulasiya:** maye. Ekvivalent üzvi komponentləri: vinasse uid. komponentləri.

Qeyri-üzvi: sidik cövhəri, qarışıq kalium duzları, kalium nit.

**Xüsusiyyətləri:** MEGAFOL bitkilər gicəkləməyə görə kompensasiya etmək üçün imkan verir bitki artımında. MEGAFOL udmanın yaxşılaşdırılması üçün faydalıdır qarışıq istifadə foliar tətbiqi məhsulları.

**Qaydası və dozası:** FOLIAR MÜALİCƏ hər 10 - 15 gün olan. Məhsul dövrü arzında. Sayda və bəzək meyvə, tərəvəz, dülicə: 2 - 3 l / ha. Meyvə, tərəvəz və seralarda bəzək: 150 - 250 ml / 100 l. 1 l / ha: herbisidlar ilə birlikdə.

**Xəbərdarlıqlar:** bu həssas bitkiləri mis ilə məhsul qarışdırmayın element; ağı yağları ilə qarışdırmayın.

*Har istifadədən əvvəl və istifadə etmədən əvvəl yaxşıca məhsul qarışdırın. Məhsul, 0 və 40°C arasında saxlanılsa, saxlanılma ilə bağlı problem yarandıracaq. Yanğın zamanı məhsulu təsir zamanı bol-bol su istifadə olunmalıdır.*

**中文 有機-無機液體肥料 NK 3-0-8**

**保証成分 w/w (w/v):** 全氮 (N) 3,0%; 有機氮 (N) 1,0%; 尿素態氮 (N) 2,0%; 水溶性氧化鉀 (K<sub>2</sub>O) 8,0%; 生物來源有機碳 (C) 9,0%. **劑型:** 液態.

**MEGAFOL | 促進植物生長及增強壓力容忍力**

**使用方法:** 葉面: 水果作物: 2 - 3 公升/公頃;

蔬菜: 開放園地: 2 - 3 公升/公頃; 溫室: 2 - 3 毫升/100 公升水;

加工作物: 2,5 - 3 公升/公頃;

**注意: 注意事項:** 植物藥害: 與銅劑混合恐造成植物藥害.

以下作物可與銅劑混合施用: 橄欖, 葡萄, 番茄. 請勿與礦物油混合使用.

Manufacturer, 제조업자, produzierte und packte durch, производитель, **ผลิตและบรรจุภัณฑ์โดย, geproducere und verpackt door, 制造和包装公司: VALAGRO S.p.A. Z. industriale, 66041 Atessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811.**

Dispose properly of packaging after use, 사용 후 포장용 잘 폐기해 주십시오, Behälter umweltgerecht entsorgen, не флагайте ро празниот сад во природа по употреба, **กรุณากำจัดภาชนะบรรจุอย่างถูกต้อง วิธีหลังการใช้, Behälter umweltgerecht entsorgen, 使用后不要将包装随地乱扔.**



Production date - production batch: see print on package/ 제조일-용기 인쇄 참조 /Produktionsdaten -Produktionslos: siehe Aufdruck auf der Verpackung / Датум на производство - пратка: погледнете го напатисот на пакувањето / วันที่ผลิต - ล็อตเลขที่ - วันหมดอายุ: กรุณาดูวันที่ผลิตบนกล่อง / Datum van productie - productietijdstip: zie stempel op de verpakking.