

CALBIT C

20L

29 Kg net mass, 순 중량, Netto gewicht, нето маса, nettomassa, ګرمایا درې ټوک، net ağırlıq, 净重

ENGLISH

Calcium complexed with LSA, CALBIT C prevents and cures symptoms of deficiency and improves firmness and shelf life of fruit and leaves.

TIMING AND RATE OF APPLICATION: Apply during phases of intense growth of plant and fruit. Foliar application: fruits, vegetables: 2-3 L/ha; leafy vegetables, ornamentals: 250-350 ml/100L. Fertigation: fruits, vegetables, processing crops, ornamentals: 10-30 L/ha.

CAUTION: A mixability test is suggested before mixing CALBIT C with BREXIL products or formulas containing phosphorus or sulphur. Calcium complex (ammonium ligninsulphonate)

COMPOSITION w/w (w/v): Calcium oxide (CaO) soluble in water 15.0% (217.5 g/L); Calcium oxide (CaO) complexed with ammonium lignin sulphonate 15.0% (217.5 g/L). Ca complexed with LSA is stable in the pH range of 3-9.

FORMULATION: liquid

In case of long storage, shake well before any samples and before using. There are no problems with product storage provided that it is done at temperatures between 0 °C and +40 °C. Should the product be involved in a fire use plenty of water.

DEUTSCH

Komplexiertes Calcium mit LSA, CALBIT C beugt und behebt Mängelscheinungen und steigert die Beschaffenheit und Erhaltung von Früchten und Blättern.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG: Während der Wachstumsphase der Pflanzen und Früchte anwenden. Anwendung für Blatt Pflanzen: Obst- und Gemüsepflanzen: 2-3 l/ha; Blattgemüse und Zierpflanzen: 250-350 ml/100l. Beregnungsdüngung: Obst-, Gemüse-, Industrie- und Zierpflanzen: 10-30 l/ha.

HINWEISE: vor dem Mischen mit BREXIL Produkten bzw. mit phosphor-oder schwefelhaltigen Produkten ist ein Mischarbeitstest durchzuführen.

CALCIUMDÜNGER - KOMPLEXIERTES CALCIUM MIT LSA

ZUSAMMENSETZUNG g/g (g/v): wasserlösliches calciumoxid (CaO) 15,0% (21,75%); calciumoxid (CaO) komplexiert mit LSA 15,0% (21,75%);

Komplexierter calcium mit LSA ist im pH-interval 3-9.

FORMULIERUNG: flüssige.

Bei langer Lagerung, das Produkt vor der Entnahme und dem Gebrauch sorgfältig vermischen. Bei Lagerung des Produkts zwischen 0 und +40 °C bestehen keine Konservierungsprobleme. Bei Umgebungsbrand mit reichlich Wasser löschen.

한국어

LSA 복합 칼슘, CALBIT C는 결핍 증상을 방지 및 치료하고 열매와 잎의 탄력과 보존 기간을 향상시킵니다.

시비 시기 및 시비량: 식물과 과일의 급성장 기간 중에 시비 업면 시비 : 과일, 채소: 2-3 L/ha; 엽채류, 관상 식물: 50-70 mL/물20리터.

관주 시비: 과일, 채소, 가공 작물, 관상 식물: 10-30 L/ha.

주의: CALBIT C를 BREXIL 계열 제품 또는 인이나 황을 함유한 제품과 혼합 사용시는 사전 배합 시험을 하시기 바랍니다.

칼슘 비료- LSA 복합 칼슘

성 분 w/w (w/v): 산화칼슘 (CaO) 15.0 % (21.7 %).

제제: 액상

МАКЕДОНСКИ

Кациум во комбинација со LSA, КАЛБИТ Ц спречува и лечи симптоми на недостаток и ја подобрува цврстината и трајноста на овошките и листите. ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА НА ПРИМЕНА: употребете го во фазите на интензивен раст на растението и овошките. Примена врз листата: овошки, зеленчук: 2-3 L/ha; кај лисјест зеленчук, украсни растенија: 250-350 mL/100L. Фертигација: овошија, зеленчук, индустриски култури, украсни растенија: 10-30 L/ha.

ВНИМАНИЕ: Пред да се измеша КАЛБИТ Ц со производите БРЕКСИЛ или со формулации кои содржат фосфор или сулфур се препорачува тест за мешање.

ЃУБРИВО СО ГЛАВНА СОСТОЈКА КАЛЦИУМ

КАЛЦИУМ ВО КОМБИНАЦИЈА СО ЛСА

СОСТАВ: тежина/тежина (тежина/волумен): Калциум Оксид (CaO) растворив во вода: 15.0% (21.6%); калциум оксид (CaO) во комбинација со амониум лингинсуфонат (LSA): 15.0% (21.7%). Калциумот збогатен со LSA е стабилен при pH вредност помеѓу 3 и 9.

ФОРМА: текча.

Во случај на долго чување, добро пропресете го пакувањето пред да земете примерок и пред употреба. Не се јавуваат проблеми со чувањето на производот под услов тој да се чува на температура помеѓу 0°C и +40°C. Доколку производот го зафати оган, употребете многу вода.

Употребете го само доколку за тоа има вистинска потреба. Не ја надминувајте препорачаната доза.



foliar application, 잎의 용용 프로그램, یافه‌نگا، 叶面喷施，yapışkan tətbiq, ფოლიარა აპლიკაცია, Blattapplikation, toepassing per blad

root application, 루트 애플리케이션, چاهه‌نگا، 根申请; kök tətbiqi, aplikacija na корен, Root-Anwendung, root-toepping

Valagro®

Where science serves nature

CALBIT C

NEEDERLANDS

CALBIT C is calcium gekomplexeerd met LSA, het voorkomt en geneest gebrekssyptomen en verhoogt de consistentie en houdbaarheid van vruchten en bladeren.

DOSISSEN EN GEBRUIKSAANWIJZING Toedienen gedurende de snelle groefasen van plant en fruit. Toediening op het blad: Fruitbomen, groenten: 2-3 L/ha; bladgroenten, sierplanten: 250-350 ml/100L. Bemestende irrigatie: fruitbomen, groenten, industriële gewassen, sierplanten: 10-30 L/ha.

WAARSCHUWING: voordat men mengt met producten BREXIL of met producten waar fosfor of zwavel in zit, moet men een mengtest uitvoeren.

MEST OP BASIS VAN CALCIUM - CALCIUM GEKOMPLEXEERD MET LSA SAMENSTELLING w/w (w/v): Calciumoxide (CaO) oplosbaar in water 15.0% (21,75%); Calciumoxide (CaO) gekomplexeerd met LSA 15.0% (21,75%). Het calcium, gekomplexeerd met LSA, is stabiel in het interval 3-9.

FORMULE: vloeibaar.

In het geval van langdurige opslag moet men het product zorgvuldig roeren voordat men het eruit haalt en vóór het gebruik. Als het product wordt bewaard bij een temperatuur tussen 0 °C en +40 °C dan zijn er geen problemen met de houdbaarheid. In geval van brand, waar het product bij betrokken is, moet men ruim water gebruiken.

AZERI

LSA ile komplekslenmiş kalsium, CALBIT C çatışmamazlıq əlamətlərinin qarşısını alır və müalicə edir və meyvə və yarpaqların möhkəmliyini və rəf ömrünü yaxşılaşdırır.

TƏTBİQ VAXTI VƏ MİQDARI: bitki və meyvaların intensiv böyümə mərhələsində tətbiq edilir. Kök xarici qidalanma: meyvə, tərəvəz: 2-3 L / ha; yarpaqlı tərəvəzlər, dekorativ bitkilər: 250-350 ml / 100L. Fertiqasıya: meyvə, tərəvəz, emal bitkiləri, dekorativ bitkilər: 10-30 L / ha.

DİQQƏT: CALBIT C-i BREXIL məhsulları və ya fosfor və kükürd ehtiva edən formulalar ilə qarışdırmadan əvvəl qarışdırılın bilmə testi takılıf olunur.

KALSİUM TƏRKİBLİ GÜBRƏ - LSA İLƏ KOMPLEKSLƏŞMİŞ KALSIUM TƏRKİBİ w / w (w / v): kalsium oksid (CaO) 15.0% (21.7%).

FORMATASI: maye.

ภาษาไทย

แคลบิท ซี ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุ และช่วยปรับปัจจัยความมันเป็นและปิดด้วยผลของพืชมีการเจริญเติบโต

ปริมาณและวิธีใช้งาน: ใช้ในช่วงที่ต้นและผลของพืชมีการเจริญเติบโต เดือน ก. การให้ในยุ่งหายใน ไม้ผลและพืชดอก ใช้อัตรา 320-480 ซีซี/ไร่ ผักกินใบและไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 250-350 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร การให้ในทางดิน ไม้ผล พืชดอก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 1.6-4.8 ลิตร/ไร่

คำ เตือน: ก่อนผสมแคลบิท ซี กับ ผลิตภัณฑ์ที่รบกวน หรือสารต่างๆซึ่งปะกวนตัวบทองฟลูฟลูส์ หรือค่า มะกัน ควรทำการทดสอบความสามารถในการผสมกันก่อน ปูบแคลเซียมในรูปดีเจล LSA

ส่วนผสม w/w (w/v): แคลเซียม (CaO) 15.0% (21.7%).

สูตร: ของเหลว

中文

鈣奇鈣液肥

1. 肥料登記證字號: 肥進(微)字第0068047號

2. 肥料品目: 4-16鈣液肥

3. 商品名稱: 鈣奇

4. 登記成分: 水溶性氧化鈣 15.0%

5. 包裝淨重: 1公升

6. 使用方法: (1) 葉面撒佈300~400倍

(2) 土壤灌注100~200倍

*請勿與磷肥混合。

7. 製造工廠: Valagro S.p.A.

法拉哥諾公司

Zona Industriale, Atessa 66040 Chieti / Italy

義大利奇地省皮爾察諾市66040桑那工業區

8. 輸入業者: 應群實業有限公司

台北市建國北路二段112號4樓

9. 製造日期: 請見包裝標示

10. 批 號: 請見包裝標示

11. 有效期限: 三年

Manufacturer, Hersteller, fabrikant, 制造和包装公司,
제조업자, производитель, ผู้ผลิตและบรรจุภัณฑ์, istehsalçı:

VALAGRO S.p.A. Z. industriale, 66041 Atessa (CH) – Italy | Tel. (+39) 0872/8811

Net mass, Nettogewicht, nettomassa, 净重, 순 중량,
neto masa, 權重と包装, net ağırlığı: **29 Kg** (20 l-20° C).