

KENDAL ROOT

10L

12 Kg massa netta, net mass, masa neta, masse nette, masa líquida, neto masa, masa netă, masa netto

ITALIANO

KENDAL ROOT NUTRE E RINFORZA L'APPARATO RADICALE.

MODALITÀ E DOSI D' IMPIEGO:

Fertirrigazione: Colture frutticole ed Orticole: 5 L/ha ogni 7 giorni in caso di bassi livelli di stress della coltura 20 L/ha ogni 20 giorni in caso di livelli di stress della coltura elevati. Lattuga e Carota: Applicazione fogliare sovra chioma 5 L/ha ogni 7 giorni in caso di bassi livelli di stress della coltura 20 L/ha ogni 20 giorni in caso di livelli di stress della coltura elevati.

Dopo l'applicazione impiegare un volume d'acqua tale da permettere di bagnare l'apparato radicale.

CONCIME CE. Sospensione di concime NK 9-0-9

COMPOSIZIONE p/p (p/v): Azoto (N) totale 9,0% (108,0 g/L); Azoto (N) ureico 9,0% (108,0 g/L); Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 9,0% (108,0 g/L).

FORMULAZIONE: Sospensione.

Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto se immagazzinato a temperatura tra 0°C e 35°C non presenta problemi di conservazione. In caso di incendio in cui il prodotto venga coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.

FRANÇAIS

KENDAL ROOT NOURRIT ET RENFORCE L'APPAREIL RACINAIRE.

MODALITÉ D' EMPLOI ET DOSES: 5 L/ha tous les 7 jours dans le cas de faibles niveaux de stress de la plante, 20 L/ha tous les 20 jours en cas de élevés niveaux de stress de la culture. Laitue et carottes: application foliaire sur le feuillage 5 L/ha tous les 7 jours en cas de faibles niveaux de stress de la culture, 20 L/ha tous les 20 jours en cas de élevé niveaux de stress de la culture. Après l'application employer un volume d'eau que permet de mouiller le système racinaire.

ENGRAIS CE. Suspension d'engrais NK 9-0-9

COMPOSITION p/p (p/v): Azote (N) total 9,0% (108,0 g/L); Azote (N) uréique 9,0% (108,0 g/L); Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau 9,0% (108,0 g/L).

FORMULATION: Suspension.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Homogénéiser le produit soigneusement avant chaque prélèvement et toute utilisation. Il est recommandé que le produit soit stocké à températures comprises entre 0°C et 35°C pour éviter tout problème de conservation.

En cas d'incendie dans lequel le produit est impliqué utiliser de l'eau en abondance.

ENGLISH

KENDAL ROOT FEEDS AND STRENGTHENS THE ROOT SYSTEM.

TIME AND RATE OF APPLICATION:

Fertigation: Vegetable and fruit crops: 5L/ha every 7 days if crop stress levels are low; 20 L/ha every 20 days if crop stress levels are high. Lettuce and Carrot: Apply to leaves over foliage 5 L/ha every 7 days if crop stress levels are low; 20 L/ha every 20 days if crop stress levels are high. After applying, use a sufficient volume of water to thoroughly wet the root system.

EC FERTILISER. NK-fertiliser suspension 9-0-9

COMPOSITION w/w (w/v): Total nitrogen (N) 9.0% (108.0 g/L); Ureic nitrogen (N) 9.0% (108.0 g/L); Water-soluble potassium oxide (K₂O) 9.0% (108.0 g/L).

FORMULATION: Suspension

Thoroughly mix the product before use.

If stored between 0°C and 35°C the product does not have any storage problems. In case of fire use plenty of water.

ESPAÑOL

KENDAL ROOT NUTRE Y REFUERZA EL APARATO RADICAL.

MODALIDADES Y DOSIFICACION: Fertilización: Frutales y hortalizas: 5 L/ha cada 7 días en el caso de bajos niveles de estrés de los cultivos, 20L/ha cada 20 días en el caso de altos niveles de estrés de los cultivos. Lechuga y zanahoria: aplicación foliar sobre el follaje 5 L/ha cada 7 días en el caso de bajos niveles de estrés de los cultivos, 20L/ha cada 20 días en el caso de altos niveles de estrés de los cultivos. Después de la aplicación emplear un volumen de agua tal como para permitir de mojar el sistema de la raíz.

ABONO CE. Suspensión de abono NK 9-0-9

RIQUEZAS GARANTIZADAS p/p (p/v): Nitrógeno (N) total 9,0% (108,0 g/L); Nitrógeno (N) ureico 9,0% (108,0 g/L); Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 9,0% (108,0 g/L).

FORMULACION: suspensión

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Homogeneizar cuidadosamente el producto antes de utilizarlo.

El producto no presenta problemas de conservación si se almacena a una temperatura comprendida entre 0°C y 35°C.

En el caso que el producto se vea envuelto en un incendio se deben utilizar abundantes cantidades de agua.

 **Valagro**[®]

Where science serves nature



Applicazione sovrachiuma, overhead application, aplicare prin pulverizare, primjena prskanjem iznad tla, napowietrznych sprayu aplikacja, aplicación por aspersión, aplicação por pulverização, application par pulvérisation.

Applicazione radicale, application racinaire, root application, aplicación a la raíz, aplicação na raiz, djeluje preko korijena, cerere radical, radical stosowanie

KENDAL ROOT

4254012F92PIER 04

PORTUGUES | KENDAL ROOT NUTRE E FORTIFICA O SISTEMA RADICULAR.

Modo e doses de aplicação: Fertilização - Fruteiras e hortícolas: 5 L/ha a cada 7 dias em caso de baixos níveis de estresse da cultura, 20 L/ha a cada 20 dias em caso de altos níveis de estresse da cultura. Alfaca e cenoura: aplicação foliar sobre a folhagem 5 L/ha a cada 7 dias, em caso de baixos níveis de estresse da cultura, 20 L/ha a cada 20 dias em caso de altos níveis de estresse da cultura. Após a aplicação empregar um volume de água de modo a permitir de molhar o sistema radicular.

ADUBO CE. Suspensão de adubos NK 9-0-9

COMPOSIÇÃO GARANTIDA p/p (p/v): Azoto (N) total 9,0% (108,0 g/L); Azoto (N) ureico 9,0% (108,0 g/L); Óxido de potássio (K₂O) solúvel em água 9,0% (108,0 g/L).

FORMULAÇÃO: suspensão

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Homogeneizar cuidadosamente o produto antes de cada utilização. O produto se for armazenado a temperatura compreendida entre 0 e 35°C não apresenta problemas de conservação.

Em caso de incêndio, com o envolvimento do produto, utilizar água em grande abundância.

ROMÂNĂ | KENDAL ROOT HRANESTE SI FORTIFICA SISTEMULUI DE RĂDĂCINI.

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Fertilizare: fructe si culturi horticoale 5 l/ha la fiecare 7 zile, în cazul unor niveluri mici de stres ale culturii 20 L/ha la fiecare 20 de zile, în cazul unor niveluri ridicate de stres ale plantelor cultivate.

SALATĂ VERDE ȘI MORCOV: Aplicare pe frunze de deasupra. 5 l/ha la fiecare 7 zile, în cazul unor niveluri mici de stres ale culturii 20 L/ha la fiecare 20 de zile, în cazul unor niveluri ridicate de stres ale plantelor cultivate. După aplicare, utilizați o cantitate de apă care să permită îmbăierea rădăcinii.

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE - Suspensie de îngrășământ NK 9-0-9

COMPOZITIE g/m (g/v): Azot (N) total 9,0% (108 g/L); Azot (N) ureic Oxid 9,0% (108 g/L); Oxid de potasiu (K₂O) solubil în apă 9,0% (108 g/L). **FORMA:** Suspensie.

După o perioadă mai lungă de depozitare, înainte de utilizare sau de prelevarea unei probe, este necesară omogenizarea conținutului. Produsul se păstrează la temperaturi cuprinse între 0°C și 35°C, fără a suferi modi cări. În caz de incendiu în care este implicat acest produs, pentru stingerea acestuia se utilizează apă din abundență.

POLSKI | KENDAL ROOT ODZYWIJA I WZMACNIA SYSTEM KORZENIOWY.

DAWKI I SPOŚOB ZASTOSOWANIA: Fertygacja: drzewa owocowe i uprawy ogrodnicze, 5 L/ha co 7 dni przy niskim poziomie stresu; 20 l/ha co 20 dni przy wysokim poziomie stresu uprawy.

SALATA, MARCHEW, ZIEMIENIAKI: Oprysk na część nadziemną: 5 L/ha, co 7 dni przy niskim poziomie stresu uprawy; 20 l/ha co 20 dni przy wysokim poziomie stresu uprawy. Po zastosowaniu należy użyć wody w ilości umożliwiającej splukanie preparatu z liści i dokładne namoczenie systemu korzeniowego.

NAWÓZ WE. Nawóz zawieszony NK 9-0-9

SKŁAD waga/waga (waga/objętość): Azot (N) całkowity 9,0% (108 g/L); Azot (N) amidowy 9,0% (108 g/L); tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K₂O) 9,0% (108 g/L).

FORMULACJA: zawiesina

Należy bardzo starannie wymieszać preparat przed każdorazowym pobraniem i zastosowaniem.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do +35°C.

W razie pożaru obejmującego produkt należy ugasić go obfitą ilością wody.

Fabricante, manufacturer, fabricante, fabricant, proizvođač, producent: **VALAGRO S.p.A.** Z. ind.le, 66041 Atessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distribuido en España y Portugal / distribuido en Espanha e Portugal por VALAGRO IBERIA SL, Carretera de Murgis 25, 04710 Santa Maria del Aguila, Almería. Distributeur au Royaume de Maroc: COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS Z. Industrielle (Route Biougra), Ait Melloul - Maroc | Tel +212 5 28 24 74 10 | casma@menara.ma. Metteur en marché en France: VALAGRO FRANCE Sa, Ecopôle des Sèolanes, 210 avenue de la Cigalière - 84250 Le Thor - France | Tel: (+33) 04.90.21.44.44 | Fax: (+33) 04.90.38.10.55. Distributed in NZ by: AGRITRADE, 1 Robin Mann Place Christchurch Airport Christchurch 8053 - New Zealand Telephone (03) 341 4587 - Fax (03) 341 4584 - Free Phone 0 800 333 855

Distributor in Croatia: AgroChem MAKSS d.o.o., Kneza Borne 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Massa netta, net mass, masa neta, masse nette, massa líquida, neto masa, masa netá, masa netto: **12 Kg (10 l - 20°C)**



valagro.com



HRVATSKI | Naziv proizvođača: KENDAL ROOT

Djelovanje gnojiva: KENDAL ROOT sadrži specifične biostimulante, osigurava biljkama intenzivan rast i razvoj na tlu infestiranom nematodama, potiče brzu vegetativnu obnovu, pojačanu otpornost korijena i stimulira obnovu i rast novog korijena. KENDAL ROOT istovremeno obavlja i prihranu biljke. EZ gnojivo.

Složeno tekuće mineralno gnojivo NK 9-0-9

Gnojivo za primjenu u voću, ukrasnom bilju, salati i mrkvi.

Naziv, tip i sadržaj hranjiva: Ukupni N = 9,0 % m/m (108 g/L) Amidni N = 9,0 % m/m (108 g/L) K₂O topiv u vodi = 9,0 % m/m (108 g/L) Gnojivo je u obliku suspenzije u vodi.

Doziranje, način i vrijeme primjene:

Način primjene	Nasad/kultura	Način upotrebe	Doziranje
Fertilizacija	Voće	Primijena svakih 7 dana	5 L/ha ako je stres biljke nizak
		Primijena svakih 20 dana	20 l/ha ako je stres biljke visok (jako oštećen korijen)
	Hortikulturni nasadi	Primijena svakih 7 dana	5 L/ha ako je stres biljke nizak
		Primijena svakih 20 dana	20 l/ha ako je stres biljke visok (jako oštećen korijen)
Folijarno	Salata i mrkva*	Primijena svakih 7 dana	5 L/ha ako je stres biljke nizak
		Primijena svakih 20 dana	20 l/ha ako je stres biljke visok (jako oštećen korijen)

*Nakon primjene prskati salatu i mrkvu sa dovoljnom količinom vode da se proizvod dopremi do tla i korijena. Gnojivo KENDAL ROOT se primjenjuje tijekom vegetacije. Prije upotrebe proizvod dobro promiješati. Prva pomoć: U slučaju gutanja proizvoda ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. U slučaju kontakta s kožom: odmah oprati sapunom i isprati većom količinom vode. U slučaju kontakta s očima: odmah isprati s većom količinom vode i zatražiti savjet liječnika

Zaštita okoliša: Sprječiti da proizvod dospjeje u podzemne/površinske vode, kanalizaciju i tlo.

Upozorenje: Odložiti ambalažu sukladno važećim propisima. Spremnik se ne smije ponovno koristiti.

Naziv i adresa proizvođača: VALAGRO S.p.A., Zona Ind.le - 66041 Atessa (Chieti) Italija.

Hrvatski gnojiva za Republiku Hrvatsku: AGROCHEM-MAKS, Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Skadishenje: Gnojivo KENDAL ROOT čuvati izvan dohvata djece i domaćih životinja, u izvornoj ambalaži i dobro zatvoreno, zaštićeno od vlage i direktnog sunčevog svjetla na temperaturi iznad 0°C i ispod 35°C. Datum proizvodnje i broj serije otisnut na ambalaži.